



AKADEMIA EDUKACYJNO - INŻYNIERSKA

www.e-MECHANiK.com.pl

MATURA STUDIA PRAKTYKA STAŻ PRACA BIZNES PRZEMYSŁ STEAM

KOMPLEKSOWE WSPARCIE EDUKACYJNE ON – LINE NA KAŻDYM ETAPIE KSZTAŁCENIA INŻYNIERSKIEGO

email: kontakt@e-mechanik.com.pl

web: www.e-MECHANiK.com.pl

fb: www.facebook.com/groups/emechanik

tel: (+48) - 697-165-075

ANALIZA MATEMATYCZNA II

"CAŁKA III – PARAMETRY GEOMETRYCZNE I FIZYCZNE BRYŁ"

PROJEKT

Wyprowadź formułę ogólną na:

- objętość
- masowy moment bezwładności

bryły geometrycznej w postaci jednorodnej kuli.

DANE:

$$z(x,y) = OK$$


SZUKAM:

$$V = ?$$

AM //

$$x^2 + y^2 + z^2 = l^2$$

$$z(x, y) = \pm \sqrt{-x^2 - y^2 + l^2}$$



$$V_{r\varphi\theta} : \begin{cases} 0 \leq r \leq l \\ 0 \leq \varphi \leq 2\pi \\ -\frac{\pi}{2} \leq \theta \leq \frac{\pi}{2} \end{cases}$$

$$V = \frac{4\pi}{3} l^3$$

$$V = \iiint_V dx dy dz = \iiint_V r^2 \sin \theta d\theta d\varphi dr$$

$$\frac{z}{r} = \sin \theta \Rightarrow z = r \sin \theta$$

$$\frac{r_{xy}}{r} = \cos \theta \Rightarrow r_{xy} = r \cos \theta$$

$$\frac{x}{r_{xy}} = \cos \varphi \Rightarrow x = r \cos \theta \cos \varphi$$

$$\frac{y}{r_{xy}} = \sin \varphi \Rightarrow y = r \cos \theta \sin \varphi$$

$$\begin{cases} \text{i)} x = r \cos \theta \cos \varphi \\ \text{ii)} y = r \cos \theta \sin \varphi \\ \text{iii)} z = r \sin \theta \\ \text{iv)} r^2 \sin \theta \end{cases}$$

$$V = \int_{-\pi/2}^{\pi/2} d\theta \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^l r^2 \sin \theta dr$$

$$\text{i)} \int r^2 \sin \theta dr = \sin \theta \int r^2 dr = \sin \theta \left[\frac{1}{3} r^3 + C \right]_0^l = \frac{1}{3} l^3 \sin \theta$$


$$\text{ii)} \int \frac{1}{3} l^3 \sin \theta d\varphi = \frac{1}{3} l^3 \sin \theta \int d\varphi = \frac{1}{3} l^3 \sin \theta [\varphi + C]_0^{2\pi} = \frac{2\pi}{3} l^3 \sin \theta$$

$$\begin{aligned} \text{iii)} \int \frac{2\pi}{3} l^3 \sin \theta d\theta &= \frac{2\pi}{3} l^3 \int \sin \theta d\theta = \frac{2\pi}{3} l^3 [\sin \theta + C]_{-\pi/2}^{\pi/2} \\ &= \frac{2\pi}{3} l^3 \left[(\sin \frac{\pi}{2} + C) - (\sin -\frac{\pi}{2} + C) \right] = \frac{2\pi}{3} l^3 \cdot 2 = \frac{4\pi}{3} l^3 \end{aligned}$$

AM II

$$x^2 + y^2 + z^2 = R^2$$

$$z(x, y) = \sqrt{-x^2 - y^2 + R^2}$$



$$\frac{r_z}{r} = \sin \theta \Rightarrow r_z = r \sin \theta$$

$$\frac{r_{xy}}{r} = \cos \theta \Rightarrow r_{xy} = r \cos \theta$$

$$\frac{x}{r_{xy}} = \cos \varphi \Rightarrow x = r \cos \theta \cos \varphi$$

$$\frac{y}{r_{xy}} = \sin \varphi \Rightarrow y = r \cos \theta \sin \varphi$$

$$\begin{cases} \text{i) } x = r \cos \theta \cos \varphi \\ \text{ii) } y = r \cos \theta \sin \varphi \\ \text{iii) } z = r \sin \theta \end{cases}$$

$$\text{iv) } dV = r^2 \sin \theta$$

$$\underline{\underline{I_2 = \iiint (x^2 + y^2) dV}}$$

$$g = \frac{m}{V} = \frac{dm}{dV} \Rightarrow dV = g dV$$

$$dV = d\theta d\varphi dr$$

$$= g \iiint ((r \cos \theta \cos \varphi)^2 + (r \cos \theta \sin \varphi)^2) \cdot r^2 \sin \theta d\theta d\varphi dr =$$

$$= g \iiint r^2 \sin^2 \theta (\sin^2 \varphi + \cos^2 \varphi) \cdot r^2 \sin \theta d\theta d\varphi dr = g \int_{-\pi/2}^{\pi/2} d\theta \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^R r^4 \sin^3 \theta dr$$

$$\text{Vergo: } \begin{cases} 0 \leq r \leq R \\ 0 \leq \varphi \leq 2\pi \\ -\frac{\pi}{2} \leq \theta \leq \frac{\pi}{2} \end{cases}$$

$$\text{i) } \int r^4 \sin^3 \theta dr = \sin^3 \theta \int r^4 dr = \sin^3 \theta \left[\frac{1}{5} r^5 + C \right]_0^R = \frac{1}{5} R^5 \sin^3 \theta$$

$$\text{ii) } \int \frac{1}{5} R^5 \sin^3 \theta d\varphi = \frac{1}{5} R^5 \sin \theta \int d\varphi = \frac{1}{5} R^5 \sin \theta [\varphi + C]_0^{2\pi} = \frac{2\pi}{5} R^5 \sin^3 \theta$$

$$III) \int \frac{2\omega}{5} l^5 \cos^3 \theta d\theta = \frac{2\omega}{5} l^5 \int \cos^3 \theta d\theta \quad IV)$$

$$IV) \int \cos^3 \theta d\theta = \int \cos^2 \theta \cdot \cos \theta d\theta = \int (1 - \sin^2 \theta) \cos \theta d\theta = \sin \theta - \frac{1}{3} \sin^3 \theta + C$$

$\sin^2 \theta = 2 \sin \theta \cos \theta$
 $\cos 2\theta = \cos^2 \theta - \sin^2 \theta$

$\sin \theta = t$
 $\cos \theta d\theta = dt$

$$= \int (1 - t^2) dt = \int dt - \int t^2 dt = -\frac{1}{3} t^3 + t = \left[-\frac{1}{3} \sin^3 \theta + \sin \theta + C \right]_{-\pi/2}^{\pi/2}$$

$$= \left[-\frac{1}{3} \sin^3(\pi/2) + \sin(\pi/2) + C \right] - \left[-\frac{1}{3} \sin^3(-\pi/2) + \sin(-\pi/2) + C \right] =$$

$$= -\frac{1}{3} + 1 - \left(-\frac{1}{3} - 1 \right) = \frac{6}{3} - \frac{2}{3} = \frac{4}{3}$$

$$\Rightarrow \bar{I}_x = 9 \int_{-\pi/2}^{\pi/2} d\theta \int_0^{2\omega} dy \int_0^l r^4 \cos^3 \theta dr = 9 \cdot \frac{8\omega}{15} l^5 = \frac{3m}{4\omega^{1/3}} \cdot \frac{8\omega}{15} l^5 = \frac{2}{5} m l^2$$

$$\Rightarrow \bar{I}_x = \frac{2}{5} m l^2$$

